

Mida San 320 NL, 15250 N

2 december 2016

A.  
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:

ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën, excl. bacteriesporen), gisten en virussen op oppervlakken in:

1. verblijfsruimten voor dieren, met uitzondering van transportvoertuigen van dieren

ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën, excl. bacteriesporen), gisten en schimmels op:

- 2a. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, bij behandeling door middel van handmatig vernevelen of met behulp van een spons

ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën, excl. bacteriesporen), gisten, schimmels, en virussen en prionen op:

- 2b. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, bij behandeling door middel van Cleaning-In-Place

ter bestrijding van micro-organismen

3. bij drinkwater na-desinfectie of nooddesinfectie door drinkwaterbedrijven, zoals bedoeld in het Drinkwaterregeling (artikel 20, lid 1 en 3)

ter bestrijding van bacteriën, gisten, schimmels, algen en mosselen in:

4. koel- en proceswater in open, doorstromende en recirculerende installaties

ter bestrijding van slijm door bacteriën en schimmels in:

5. installaties in de papier- en kartonindustrie

Het middel kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

De doseringen en het gebruik van het middel zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.  
GEBRUIKSAANWIJZING

**Algemeen**

Het middel is bestemd voor het desinfecteren van oppervlakken, materialen, apparatuur en gebruiksvoorwerpen, voor drinkwater in drinkwaterbedrijven, alsmede voor koel- en proceswater.

Zorg tijdens gebruik voor goede ventilatie.

## **Toepassingsgebieden en doseringen**

1.Desinfectie van oppervlakken in verblijfplaatsen voor dieren, met uitzondering van transportvoertuigen van dieren.

De oppervlakken dienen vooraf gereinigd te worden. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water.

Verspuit de gebruiksooplossing onder lage druk (3-8 bar) met een handspuit. Gebruik 150 ml per m<sup>2</sup>. Behandelde oppervlakken na de inwerktijd afspuiten met water.

Dosering: 2,4% (240 ml middel met water aanvullen tot 10 Liter).

Minimale inwerktijd: 5 minuten

2a. Desinfectie van oppervlakken en materialen, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Verdun het middel met water tot gebruiksconcentratie. Behandelde oppervlakken, apparaten, materialen en leidingen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels

- Handmatig vernevelen onder lage druk (3-8 bar),

Dosering: 1% (100 ml middel met water aanvullen tot 10 L)

Minimale inwerktijd: 5 minuten

Naspoelen met schoon leidingwater

Desinfecteren van vloeren met behulp van emmer en spons

Dosering: 1% (100 ml middel met water aanvullen tot 10 L)

Minimale inwerktijd: 5 minuten

Laten drogen aan de lucht

2b. Cleaning-in-place (CIP) in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Dosering: 0,3% (30 ml middel met water aanvullen tot 10 L)

Dosering voor virussen en prionen: 3,4% (340 ml middel met water aanvullen tot 10 L)

Minimale inwerktijd: 15 minuten

Leidingen naspoelen met schoon leidingwater

3.Drinkwater na-desinfectie of nooddeseinfectie door drinkwaterbedrijven.

Continue dosering door middel van een automatisch doseersysteem.

Gebruiksconcentratie: max. 0,5 mg/L vrij beschikbaar chloor

4.Koel- en proceswater in open, doorstromende en recirculerende installaties. Continue of discontinue dosering door middel van een automatisch doseersysteem.

Gebruiksconcentratie: 0,5-10 mg/L

- koelwater, open, recirculerende of gesloten systemen, continue dosering

5 mg/L

- idem, stootsgewijze dosering, inwerkingtijd 15-60 minuten

10 mg/L

5.Toepassing als slijmbestrijdingsmiddel in installaties in de papier- en kartonindustrie.  
Continue dosering door middel van een automatisch doseersysteem.

Gebruiksconcentratie: 2-10 mg/L of 55-280 g/ton papier.

**N.B.:**

- Verpakking koel en donker bewaren.
- Het middel niet mengen met reinigingsmiddelen.